

## Devoir commun 2017 – correction sujet A

### Exercice 1

Le DAS, « Débit d’Absorption Spécifique », est un indice qui mesure le niveau de radiofréquences émis par un téléphone portable envers l’usager durant son fonctionnement en puissance maximale.

On a étudié le DAS de 625 téléphones portable sur le marché en France et aux Etats-Unis.

Les résultats sont indiqués dans le tableau donné en **Annexe 1**.

1. a) Calculer la fréquence en pourcentage des téléphones portables ayant un DAS dans l’intervalle  $[0,5;0,7[$

$$\frac{114}{625} \times 100 = 18,24 \text{ Il y a } \mathbf{18,24\%}$$
 des téléphones portables ayant un DAS dans l’intervalle  $[0,5;0,7[$

- b) Compléter le tableau donné en Annexe 1 sans justifier.

Intervalle dans lequel se trouve le DAS	Centre de l’intervalle	Effectif	Fréquence en %	Fréquence cumulée croissante en %
$[0,1;0,3[$	<b>0,2</b>	17	<b>2,72</b>	<b>2,72</b>
$[0,3;0,5[$	<b>0,4</b>	32	<b>5,12</b>	<b>7,84</b>
$[0,5;0,7[$	<b>0,6</b>	114	<b>18,24</b>	<b>26,08</b>
$[0,7;0,9[$	<b>0,8</b>	185	<b>29,6</b>	<b>55,68</b>
$[0,9;1,1[$	<b>1</b>	78	<b>12,48</b>	<b>68,16</b>
$[1,1;1,3[$	<b>1,2</b>	94	<b>15,04</b>	<b>83,2</b>
$[1,3;1,5[$	<b>1,4</b>	76	<b>12,16</b>	<b>95,36</b>
$[1,5;1,7]$	<b>1,6</b>	29	<b>4,64</b>	<b>100</b>
	<b>Total</b>	<b>625</b>	<b>100</b>	

2. a) Déterminer la moyenne à 0,01 près (on prendra le centre de l’intervalle pour les calculs)

$$\bar{x} = \frac{17 \times 0,2 + 32 \times 0,4 + \dots + 29 \times 1,6}{625} \approx 0,92 \text{ La moyenne est d'environ } \mathbf{0,92}$$
 à 0,01 près

- b) Déterminer l’étendue de cette série statistique.

$$1,7 - 0,1 = 1,6 \text{ . L'étendue est de } \mathbf{1,6}$$


3. Déterminer la classe où se situe la médiane. Justifier votre réponse avec précision.

$$\frac{625}{2} = 312,5 \text{ La médiane correspond au DAS du } 313^{\text{ème}}$$
 téléphone qui est **dans la classe**  $[0,7;0,9[$

4. On donne en **Annexe 2** le polygone des fréquences cumulées croissantes exprimées en pourcentage. La médiane est l’antécédent de la proportion 50 % par la fonction représentée par ce polygone.

- a) Lire graphiquement la médiane avec toute la précision permise par le graphique.

**Il semble que la médiane soit de 0,86 environ**



b) En vous inspirant de la question précédente, lire graphiquement le premier quartile et le troisième quartile avec toute la précision permise par le graphique.

$$Q_1 \approx 0,69 \text{ et } Q_3 \approx 1,19$$

5. Le téléphone portable de Florence Leretour a un DAS de 0,9. Son téléphone fait-il partie de la moitié des portables qui ont le DAS le plus faible ? Justifier.

La médiane étant de 0,86 environ, cela signifie qu'au moins la moitié des téléphones ont un DAS de 0,86 ou moins. Donc **son téléphone ne fait pas partie de la moitié des portables qui ont le DAS le plus faible.**

### Exercice 2 Pensez à changer de copies

Une entreprise fabrique un parfum. On note  $x$  la quantité produite quotidiennement en hectolitres.

Les capacités de production de l'entreprise imposent que  $x \in [0 ; 450]$ . Le bénéfice quotidien en euro est donné

par la fonction  $B$  définie sur  $[0 ; 450]$  par :  $B(x) = -2x^2 + 808x - 3200$

Un bénéfice strictement négatif signifie que l'entreprise est déficitaire : C'est-à-dire qu'elle perd de l'argent.

Un bénéfice strictement positif signifie que l'entreprise est bénéficiaire.

On donne en **Annexe 3** la courbe de la fonction  $B$ .

On laissera une trace des lectures graphiques demandées dans cet exercice.

1. A l'aide de la courbe donnée en **Annexe 3** et avec toute la précision possible donner :

a) Pour quelles valeurs de  $x$  l'entreprise est-elle bénéficiaire ?

L'entreprise semble bénéficiaire pour  $x \in ]5 ; 400[$

b) Pour quelle valeur de  $x$  l'entreprise fait-elle un bénéfice maximal ?

Le bénéfice semble maximal pour  $x=200$

2. Montrez que :

a)  $B(x) = (x-400)(8-2x)$

$$(x-400)(8-2x) = 8x - 2x^2 - 3200 + 800x = -2x^2 + 808x - 3200 = f(x)$$

b)  $B(x) = -2(x-202)^2 + 78408$

$$-2(x-202)^2 + 78408 = -2(x^2 - 404x + 40804) + 78408 = -2x^2 + 808x - 81608 + 78408$$

Ainsi  $-2(x-202)^2 + 78408 = -2x^2 + 808x - 3200 = f(x)$

3. a) A l'aide d'une forme adaptée, étudiez le signe de  $B(x)$ .

On utilise la forme factorisée:

$x-400 > 0 \Leftrightarrow x > 400$  et  $8-2x > 0 \Leftrightarrow -2x > -8 \Leftrightarrow x < 4$  Cela nous permet de dresser le tableau de signes

$x$	0	4	400	450	
$x-400$	-	-	0	+	
$8-2x$	+	0	-	-	
$B(x)$	-	0	+	0	-

b) En déduire pour quelles valeurs de  $x$  l'entreprise est bénéficiaire.

L'entreprise est bénéficiaire sur  $]4; 400[$

4. a) A l'aide d'une forme adaptée, dresser le tableau de variation de la fonction  $B$  sur  $[0; 450]$

La forme canonique nous permet de dresser le tableau de variation:

$x$	0	202	450
$B(x)$		78408	

b) En déduire pour quelle valeur de  $x$  l'entreprise fait un bénéfice maximal et préciser ce bénéfice maximal.

Le bénéfice est maximal quand  $x=202$ . Celui-ci est de 78408 €

5. En 2017, l'état décide de prélever une nouvelle taxe de 100 € par hectolitre produit.

La taxe en euro est donné par la fonction  $T$  définie sur  $[0; 450]$  par  $T(x) = 100x$


a) Quel est le montant de la taxe si l'entreprise produit 200 hl de parfum ? Quel est alors le bénéfice de l'entreprise taxe déduite ?

$$T(200) = 100 \times 200 = 20000 \text{ . Pour 200hl, la taxe est de 20000€}$$

$$B(200) = -2 \times 200^2 + 808 \times 200 - 3200 = 78400$$

$$B(200) - T(200) = 78400 - 20000 = 58400 \text{ . Le bénéfice taxe déduite sera de 58400€}$$

b) Tracer la représentation graphique de la fonction  $T$  dans le repère donné en **Annexe 3**



c) En déduire graphiquement pour quelles valeurs de  $x$  l'entreprise est bénéficiaire après l'application de cette taxe.

L'entreprise semble bénéficiaire pour  $x \in [5; 350]$

6. On propose l'algorithme suivant :

<b>Variables :</b>	$A$ est un nombre dans l'intervalle $[0; 450]$
<b>Entrée :</b>	Lire la valeur $A$
<b>Traitement :</b>	Si $-2A^2 + 708A - 3200 > 0$ Alors afficher « L'entreprise est bénéficiaire en 2017 » Sinon afficher « L'entreprise n'est pas bénéficiaire en 2017 » Fin du Si

a) Qu'affichera l'algorithme si on entre  $A=380$  ? Justifier.

$$-2 \times 380^2 + 708 \times 380 - 3200 = -22960 < 0$$

Donc l'algorithme affichera "L'entreprise n'est pas bénéficiaire en 2017"

7. Expliquer pourquoi on teste l'inégalité «  $-2A^2 + 708A - 3200 > 0$  » dans le contexte de la production de cette entreprise ?

L'entreprise est bénéficiaire si  $B(x) - T(x) > 0$

Or  $B(x) - T(x) = -2x^2 + 808x - 3200 - 100x = -2x^2 + 708x - 3200$

### Exercice 3

On munit le plan d'un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  et on considère les points :

$$A(-3; 2) B(2; 4) C(5; -3)$$

On donne un repère en **Annexe 4** que l'on complétera au fur et à mesure des questions.

1) Calculer :

a) Les coordonnées du point I milieu du segment  $[AC]$  .

$$x_I = \frac{x_A + x_C}{2} = \frac{-3 + 5}{2} = 1 \text{ et } y_I = \frac{y_A + y_C}{2} = \frac{2 + (-3)}{2} = -0,5$$

b) Les coordonnées du vecteur  $\vec{AB}$  .

$$\vec{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix} = \vec{AB} \begin{pmatrix} 2 - (-3) \\ 4 - 2 \end{pmatrix} = \vec{AB} \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

c) La longueur BC.

$$BC = \sqrt{(x_C - x_B)^2 + (y_C - y_B)^2} = \sqrt{(5 - 2)^2 + (-3 - 4)^2} = \sqrt{9 + 49} = \sqrt{58}$$

2) Le triangle ABC est-il rectangle ? Justifier à l'aide de calculs.

Calculons également avec la même technique les distances  $AB = \sqrt{5^2 + 2^2} = \sqrt{29}$  et  $AC = \sqrt{8^2 + (-5)^2} = \sqrt{89}$   
Nous avons alors  $AC^2 = 89$  puis  $AB^2 + BC^2 = 29 + 58 = 87$ , l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée, ainsi par contraposée du théorème de Pythagore, nous pouvons affirmer que le triangle n'est pas rectangle.

3) On considère les points M et N tels que :

$$\vec{BM} = -\frac{1}{3} \vec{BC}; \vec{AN} = \frac{3}{2} \vec{AB} + \frac{1}{2} \vec{AC}$$

Placer, sans justifier, les points M et N dans le repère donné en **Annexe 4**

**Voir la figure à la fin de l'exercice.**

On s'appuie sur le quadrillage pour déterminer  $-\frac{1}{3} \vec{BC}$  ou encore  $\frac{1}{2} \vec{AB}$  et en déduire  $\frac{3}{2} \vec{AB}$  .

Par ailleurs  $\frac{1}{2} \vec{AC}$  est aussi le vecteur  $\vec{AI}$  puisque I est le milieu de  $[AC]$  .

4) On considère les points P et R tels que :

- ABCP est un parallélogramme.
- R est le symétrique de P par rapport à C.

a) Calculer les coordonnées des points P et R.

Comme ABCP est un parallélogramme, on a l'égalité  $\vec{AB} = \vec{PC}$  donc leur coordonnées sont égales.

Puisque  $\vec{AB} \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$  et  $\vec{PC} \begin{pmatrix} 5 - x_P \\ -3 - y_P \end{pmatrix}$  il vient :  $\begin{cases} 5 = 5 - x_P \\ 2 = -3 - y_P \end{cases}$  d'où  $\begin{cases} 0 = -x_P \\ 5 = -y_P \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_P = 0 \\ y_P = -5 \end{cases}$  : P(0; -5)

Comme R est le symétrique de P par rapport à C, C est donc le milieu de  $[PR]$ , ainsi :

$$x_C = \frac{x_P + x_R}{2} \text{ et } y_C = \frac{y_P + y_R}{2} \text{ ce qui équivaut à } 5 = \frac{0 + x_R}{2} \text{ et } -3 = \frac{-5 + y_R}{2} \text{ donc } 10 = x_R \text{ et } -6 = -5 + y_R .$$

Finalement R(10; -1)

b) On considère un point S(x; 0) tel que les vecteurs  $\vec{AB}$  et  $\vec{SC}$  soient colinéaires.

Calculer  $x$

$\vec{SC} \begin{pmatrix} x_C - x_S \\ y_C - y_S \end{pmatrix} = \vec{SC} \begin{pmatrix} 5 - x_S \\ -3 - y_S \end{pmatrix} = \vec{SC} \begin{pmatrix} 5 - x \\ -3 \end{pmatrix}$  est colinéaire à  $\vec{AB} \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$  si et seulement si leurs coordonnées sont proportionnelles, ce qui équivaut à l'égalité des produits :  $2 \times (5 - x)$  et  $5 \times (-3)$ , cela nous donne l'équation :

$$2(5 - x) = -15 \text{ d'où } 25 - 5x = -6 \Leftrightarrow -5x = -31 \Leftrightarrow x = -\frac{31}{-5} = 6,2$$

c) Les points P, S et R sont ils alignés ? Justifier.

**1ère méthode :** Ce sera le cas si et seulement si les vecteurs  $\vec{PS}$  et  $\vec{PR}$  sont colinéaires.

Vérifions avec leurs coordonnées :

$\vec{PS} \begin{pmatrix} 12,5 \\ 5 \end{pmatrix}$  et  $\vec{PR} \begin{pmatrix} 10 \\ 4 \end{pmatrix}$  sont colinéaires  $\Leftrightarrow 4 \times 12,5$  et  $5 \times 10$  sont égaux, ce qui est le cas !

Donc les vecteurs  $\vec{PS}$  et  $\vec{PR}$  sont colinéaires d'où les points P, S et R sont alignés .

**2ème méthode :** Grâce à d'autres alignements et des parallélismes déjà connus :

ABCP est un parallélogramme (voir 4.a.) donc  $(AB) \parallel (CP)$ , par ailleurs,  $(AB) \parallel (SC)$  puisque  $\vec{AB}$  et  $\vec{SC}$  sont colinéaires (voir 4.b.) ; finalement les droites  $(CP)$  et  $(SC)$  sont nécessairement parallèles.

Ces dernières ont un point commun C donc elles sont même confondues : les points P, S, C sont sur la même droite  $(PC)$ .

En outre, R est le symétrique de P par rapport à C (voir 4.a.), ce qui prouve que  $R \in (PC)$ , ainsi :

S, R, P, C sont sur la même droite  $(PC)$  donc tous alignés !

